## 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	悪性軟部腫瘍	軟部腫瘍 ルート リサ								
適応	脂肪肉腫									
No(3桁)	003	CODE	011001001003							
診療科	内科	医師	堤							
セット名称	MAID【イメント・併用】									
申請年月日	平成24年8月1日									
緊急	•	通常								

抗癌剤名称	手技	標準投与量							
イホマイド	DIV	2500	mg/m²						
ドキソルビシン	CIV	20	mg/m²						
ダカルバジン	DIV	300	mg/m²						
ウロミテキサン	コミテキサン DIV		mg/m <sup>²</sup>						

Aポート Vポート	末梢		確認							
		医師	看護師	薬剤師						

			招	设与ス	スケ	ジュ-	ール	·:	(		;	投		休	. )	or	(Int	erva	al日	数	21	日	) 《		> 2	ו—ל	L
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2 3	3 4	5	6	7	8	9	10	11 1	2 13	14	15	6 17	7 18	19	20	21 2	2 23	24	25	26 2	27 2	8
1	ソルデム3A 1L + ラクテック 500mL	24時間		•																							1
'	手技:静脈内 経路:	CIV																									
2	生食 100mL+デキサート6.6mg+アロキシ 1V	30分		•																							7
	手技:静脈内 経路:【イメンド併用】1の側管	DIV																									
3	生食 100mL+デキサート6.6mg	30分																					•				
3	手技:静脈内 経路:1の側管	DIV		•																							
4	生食 250mL+ドキソルビシン( )mg	24時間		•																							
	手技:静脈内 経路:	CIV																									
5	ウロミテキサン( )mg+生食50mL	30分		•																							
	手技:静脈内 経路:IFO開始時 1の側管	DIV																									
6	イホマイド( )mg+生食500mL	3時間		•																							
	手技:静脈内 経路: 1の側管,溶解後6時間以内に投与終了すること	DIV																									
7	ダカルバジン( )mg + 注射用水 + 生食500mL	3時間		•																							
,	手技:静脈内 経路: 1の側管 1Vあたり10mLのワッサーで溶解	遮光でDIV																									
8	ウロミテキサン( )mg+生食50mL	30分		•																							
0	手技:静脈内 経路:IFO開始4時間後 1の側管	DIV																									
9	ウロミテキサン( )mg+生食50mL	30分		•							Ī																
9	手技:静脈内 経路:IFO開始8時間後 1の側管	DIV																									
10	ヘパリンNa 1筒					•					Ī																
10	手技:静脈内 経路:																									$\perp$	