# 化学療法レジメンセット登録用紙



| 領域 | 悪性軟部腫瘍 | ルート | リザーバー |
|---|---|---|---|
| 適応 | 脂肪肉腫 | | |
| No(3桁) | 008 | CODE | 011001001008 |
| 診療科 | 内科 | 医師 | 堤 |
| セット名称 | MAID(THP)【ｲﾒﾝﾄﾞ併用】 | | |
| 申請年月日 | 平成26年10月8日 | | |
| 緊急 | ● | 通常 | |

| 抗癌剤名称 | 手技 | 標準投与量 |
|---|---|---|
| イホマイド | DIV | 2500 mg/㎡ |
| ピノルビン | CIV | 20 mg/㎡ |
| ダカルバジン | DIV | 300 mg/㎡ |
| ウロミテキサン | DIV | 500 mg/㎡ |
| | | |
| | | |

| Aポート | Vポート | 末梢 | 確認 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 医師 | 看護師 | 薬剤師 |
| | ● | | | | |

投与スケジュール: ( 投 休 ) or (Interval日数 21 日)《 》クール

| 投与順 | Rp | 投与時間 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソルデム3A 1L + ラクテック 500mL<br>手技:静脈内 経路: | 24時間<br>CIV | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | |
| 2 | 生食 100mL+デキサート6.6mg+アロキシ 1V<br>手技:静脈内 経路:【ｲﾒﾝﾄﾞ併用】 1の側管 | 30分<br>DIV | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 3 | 生食 100mL+デキサート6.6mg<br>手技:静脈内 経路:1の側管 | 30分<br>DIV | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | |
| 4 | 5%ブドウ糖 250mL+ピノルビン( )mg<br>手技:静脈内 経路: | 24時間<br>CIV | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | |
| 5 | ウロミテキサン( )mg+生食50mL<br>手技:静脈内 経路:IFO開始時 1の側管 | 30分<br>DIV | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | |
| 6 | イホマイド( )mg+生食500mL<br>手技:静脈内 経路: 1の側管,溶解後6時間以内に投与終了すること | 3時間<br>DIV | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | |
| 7 | ダカルバジン( )mg + 注射用水 + 生食500mL<br>手技:静脈内 経路: 1の側管 1Vあたり10mLのワッサーで溶解 | 3時間<br>遮光でDIV | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | |
| 8 | ウロミテキサン( )mg+生食50mL<br>手技:静脈内 経路:IFO開始4時間後 1の側管 | 30分<br>DIV | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | |
| 9 | ウロミテキサン( )mg+生食50mL<br>手技:静脈内 経路:IFO開始8時間後 1の側管 | 30分<br>DIV | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | |
| 10 | ヘパリンNa 1筒<br>手技:静脈内 経路: | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |

レジメ検討委員会