

化学療法レジメンセット登録用紙

1/1頁

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	胆道・膵臓がん		
No(3桁)	018	CODE	001005001018
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	GC+Durvalumab【APR併用】		
申請年月日	令和 4 年	1月10日	
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ゲムシタビン	DIV	1000 mg/m ²
シスプラチン	DIV	25 mg/m ²
イミフィンジ	DIV	1500 mg/body

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師

※ 併用療法後、維持療法としてイミフィンジ 1500mg4週毎で投与

投与スケジュール: (2 投 1 休) or (投与間隔 21 日)《 8 》クール

※ イミフィンジ: 体重30kg以下の場合、20mg/kg

Total時間入力		☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐																														
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: [アプレピナント服用]/プライミング用/フィルター使用	IV		●																					(●)							
2	イミフィンジ 1500mg +生食 100mL 手技: 静脈内 経路:	60分 DIV		●																					(●)							
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		●																					(●)							
4	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 6.6mg 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●							●														(●)							
5	シスプラチン ()mg +生食 500mL 手技: 静脈内 経路:	90分 DIV		●							●														(●)							
6	ソルデム3A 500mL 手技: 静脈内 経路:	60分 DIV		●							●														(●)							
7	ゲムシタビン ()mg +生食 100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●							●														(●)							
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●							●														(●)							
9	手技: 経路:																															
10	手技: 経路:																															