

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	婦人科がん	ルート	リザーバー
適応	卵巣がん		
No(3桁)	017	CODE	007002001017
診療科	婦人科	医師	山下
セット名称	★PLD-C+BEV		
申請年月日	令和3年3月8日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ドキシル	DIV	30 mg/m <sup>2</sup>
カルボプラチン	DIV	5 AUC
		上限750mg/body
アバステン	DIV	10 mg/kg

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

			投与スケジュール: ( 投 休 ) or (投与間隔 28 日)《 》クール																												
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	デキサート 16.5mg + グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: ★フィルター不可/アプレピタント併用	15分 DIV		●																											
2	生食 250mL + カルボプラチン ( )mg 手技: 静脈内 経路:	90分 DIV		●																											
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV		●																											
4	5%ブドウ糖液 250mL + ドキシル ( )mg 手技: 静脈内 経路:	90分 DIV		●																											
5	5%ブドウ糖液 100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●																											
6	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV		●															●												
7	生食 100mL + アバステン ( )mg 手技: 静脈内 経路:	90-30分 DIV		●															●												
8	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV		●															●												
9	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 経路:	IV		●															●												
10	手技: 経路:																														