

化学療法レジメンセット登録用紙

1/1頁

領域	婦人科がん	ルート	リザーバー
適応	卵巣がん		
No(3桁)	071	CODE	007002001071
診療科	婦人科	医師	山下
セット名称	VIP		
申請年月日	平成26年9月10日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
シスプラチン	DIV	20 mg/m ²
エトポシド	DIV	75 mg/m ²
イホマイド	DIV	1200 mg/m ²
ウロミテキサン	DIV	240 mg/m ² /回

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

			投与スケジュール：（投 休）or（投与間隔 21 日）《 》クール																												
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ソルデム3A 1000mL + ラクテック 1000mL 手技：静脈内 経路：メインルート	24時間 DIV		●	●	●	●	●	●																						
2	グラニセロンバック 50mL + デキサート 6.6mg 手技：静脈内 経路：側管/アプレピタント併用	30分 DIV		●	●	●	●	●																							
3	生食 500mL + エトポシド（ ）mg 手技：静脈内 経路：側管	2時間 DIV		●	●	●	●	●																							
4	生食 50mL + ウロミテキサン（ ）mg 手技：静脈内 経路：イホマイド開始前に	15分 DIV		●	●	●	●	●																							
5	生食 500mL + イホマイド（ ）mg 手技：静脈内 経路：側管、溶解後6時間以内に投与終了すること	4時間 DIV		●	●	●	●	●																							
6	生食 50mL + ウロミテキサン（ ）mg 手技：静脈内 経路：イホマイド開始4時間後に	15分 DIV		●	●	●	●	●																							
7	マンニトール 300mL 手技：静脈内 経路：側管	1時間 DIV		●	●	●	●	●																							
8	生食 500mL + シスプラチン（ ）mg 手技：静脈内 経路：側管	2時間 DIV		●	●	●	●	●																							
9	生食 50mL + ウロミテキサン（ ）mg 手技：静脈内 経路：イホマイド開始8時間後に	15分 DIV		●	●	●	●	●																							
10	ヘパリンNa 1筒 手技：静脈内 経路：								●																						