

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	婦人科がん	ルート	リザーバー
適応	卵巣がん		
No(3桁)	072	CODE	007002001072
診療科	婦人科	医師	山下
セット名称	★VeIP		
申請年月日	平成26年9月10日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
シスプラチン	DIV	20 mg/m <sup>2</sup>
エクザール	DIV	0.11 mg/kg
イホマイド	DIV	1200 mg/m <sup>2</sup>
ウロミテキサン	DIV	240 mg/m <sup>2</sup> /回

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: ( 投 休 ) or (投与間隔 21 日)《 》クール																											
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ソルデム3A 1000mL + ラクテック 1000mL 手技: 静脈内 経路: メインルート	15時間 DIV		●	●	●	●	●																						
2	グラニセロンバック 50mL + デキサート 6.6mg 手技: 静脈内 経路: 側管/アプレピタント併用	30分 DIV		●	●	●	●	●																						
3	生食 50mL + エクザール( )mg 手技: 静脈内 経路: 側管	30分 DIV		●	●																									
4	生食 50mL + ウロミテキサン( )mg 手技: 静脈内 経路: イホマイド開始前に	15分 DIV		●	●	●	●	●																						
5	生食 500mL + イホマイド( )mg 手技: 静脈内 経路: 側管、溶解後6時間以内に投与終了すること	4時間 DIV		●	●	●	●	●																						
6	生食 50mL + ウロミテキサン( )mg 手技: 静脈内 経路: イホマイド開始4時間後に	15分 DIV		●	●	●	●	●																						
7	マンニトール 300mL 手技: 静脈内 経路: 側管	1時間 DIV		●	●	●	●	●																						
8	生食 500mL + シスプラチン( )mg 手技: 静脈内 経路: 側管	2時間 DIV		●	●	●	●	●																						
9	生食 50mL + ウロミテキサン( )mg 手技: 静脈内 経路: イホマイド開始8時間後に	15分 DIV		●	●	●	●	●																						
10	ソルデム3A 1000mL + ラクテック 1000mL 手技: 静脈内 経路: メインルート	24時間 DIV							●																					

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	婦人科がん	ルート	リザーバー
適応	卵巣がん		
No(3桁)	072	CODE	007002001072
診療科	婦人科	医師	山下
セット名称	★VeIP		
申請年月日	平成26年9月10日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
シスプラチン	DIV	20 mg/m <sup>2</sup>
エクザール	DIV	0.11 mg/kg
イホマイド	DIV	1200 mg/m <sup>2</sup>
ウロミテキサン	DIV	240 mg/m <sup>2</sup> /回

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与スケジュール: ( 投 休 ) or (投与間隔 21 日)《 》クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
11	ヘパリンNa 1筒 手技: 静脈内      経路:								●																							