

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	婦人科がん	ルート	リザーバー
適応	子宮体がん		
No(3桁)	031	CODE	007003001031
診療科	婦人科	医師	山下
セット名称	IT		
申請年月日	平成31年4月5日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
パクリタキセル	DIV	135 mg/m ²
イホマイド	DIV	1600 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※ 令和3年8月11日改訂: DEX+ファモチジンIV → DIVへ

			投与スケジュール: (1 投 3 休) or (投与間隔 28 日) 《 》 クール																													
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	デキサート 9.9mg +ファモチジン 20mg +グラニセロンバッグ 50mL 手技: 静脈内 経路: フィルター使用/【アプレピタント併用】	30分 DIV		●																												
2	グラニセロンバッグ 50mL +デキサート 6.6mg 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV			●	●																										
3	パクリタキセル()mg +生食 500mL 手技: 静脈内 経路: レスタミンコーワ服用30分後から	3時間 DIV		●																												
4	生食 50mL +ウロミテキサン()mg 手技: 静脈内 経路: 側管より/イホマイド開始前(240mg/m ²)	15分 DIV		●	●	●																										
5	イホマイド()mg +生食 500mL 手技: 静脈内 経路: 側管より/溶解後6hr以内に投与終了する	4時間 DIV		●	●	●																										
6	生食 50mL +ウロミテキサン()mg 手技: 静脈内 経路: 側管より/イホマイド投与開始4時間後(240mg/m ²)	15分 DIV		●	●	●																										
7	ソルデム3A 1000mL +ラクテック 500mL 手技: 静脈内 経路:	12時間 DIV		●	●	●																										
8	生食 50mL +ウロミテキサン()mg 手技: 静脈内 経路: 側管より/イホマイド投与開始8時間後(240mg/m ²)	15分 DIV		●	●	●																										
9	ヘパリンNa 1筒 手技: 静脈内 経路:	IV		●	●	●																										
10	手技: 経路:																															