

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	婦人科がん	ルート	リザーバー
適応	子宮体がん		
No(3桁)	043	CODE	007003001043
診療科	婦人科	医師	山下
セット名称	IA		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
イホマイド(d1-3)	DIV	2000 mg/m <sup>2</sup>
イホマイド(d4-5)	DIV	1500 mg/m <sup>2</sup>
ドキソルビシン	IV	20 mg/m <sup>2</sup>

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与スケジュール: ( 1 投 3~4 休 ) or (投与間隔 21~28日) 《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●	●																							
2	生食 50mL +ウロミテキサン 400mg 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		●	●	●	●	●																							
3	イホマイド ( )mg +生食 1000mL +メイロン 40mL 手技: 静脈内 経路:溶解後6時間以内に投与終了すること	4時間 DIV		●	●	●																									
4	イホマイド ( )mg +生食 1000mL +メイロン 40mL 手技: 静脈内 経路:溶解後6時間以内に投与終了すること	4時間 DIV						●	●																						
5	生食 50mL +ウロミテキサン 400mg 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		●	●	●	●	●																							
6	ドキソルビシン ( )mg +注射用水 20mL 手技: 静脈内 経路:	5分 IV		●	●	●																									
7	ソルデム3A 500mL 手技: 静脈内 経路:	2時間 DIV		●	●	●	●	●																							
8	ソルデム3A 500mL 手技: 静脈内 経路:	2時間 DIV		●	●	●	●	●																							
9	生食 50mL +ウロミテキサン 400mg 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		●	●	●	●	●																							
10	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV		●	●	●	●	●																							
11	ヘパリンNa 1筒 手技: 静脈内 経路:	IV		●	●	●	●	●																							