レジメ検討委員会

## 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	婦人科がん	ルート	リザーバー								
適応		子宮頸がん									
No(3桁)	007	CODE	007004001007								
診療科	婦人科	医師	浅野								
セット名称	★TC(	CX)+Per	nbrolizumab								
申請年月日	<b>4</b>	令和4年10月3日									
緊急		通常	•								

抗癌剤名称	手技	標準	<b>捧投</b> 与量
キイトルーダ	DIV	200	mg/body
パクリタキセル	DIV	175	mg/m <sup>*</sup>
カルボプラチン	DIV	5	AUC
カルハノファン	DIV	上限7	50mg/body

Aポート	∨ポート	末梢		確認	
			医師	看護師	薬剤師

<b>緊</b> 尼	. □ □ 世常 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □																													
※ 令和3年8月11日改訂:DEX+ファモチジンIV➡DIVへ				投与スケジュール: (						 投			休	) (	or	 (投与間隔				21 日)《 6 》					<u> </u>	クー	ル			
		Total時間入力			г т																			<b>_</b>			σī	Ī		
投与順	与順 Rp		-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 1	6 1	7 18	3 19	9 20	0 21	22	23	24	25 2	26 2	7 28	29
1 1	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミング用/フィルター使用/【アプレピタント併用】	IV		•																				( • )						
1 2	キイトルーダ 200mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		•													1							( • )						
1 3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		•													1							( • )						
4	デキサート 9.9mg +ファモチジン 20mg +グラニセトロンバッグ 50mL 手技:静脈内 経路:レスタミンコーワ服用	30分 DIV		•																				( • )						
5	パクリタキセル ( )mg +生食 500mL 手技:静脈内 経路:レスタミンコーワ服用30分後から	3時間 DIV		•																				( • )						
1 6	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		•																				( • )						
1 7	カルボプラチン ( )mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:	90分 DIV		•																				( • )						
8	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV		•																				( • )						
9	ヘパリンNa 1筒 手技:静脈内 経路:	IV		•																				( • )						
10	手技: 経路:																													