

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	婦人科がん	ルート	リザーバー
適応	子宮頸がん		
No(3桁)	008	CODE	007004001008
診療科	婦人科	医師	浅野
セット名称	★TC(CX)+BEV+Penbrolizumab		
申請年月日	令和4年10月5日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ	DIV	200 mg/body
パクリタキセル	DIV	175 mg/m <sup>2</sup>
カルボプラチン	DIV	5 AUC
		上限750mg/body
アバスチン	DIV	15 mg/kg

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※ 令和3年8月11日改訂:DEX+ファモチジンIV⇒DIVへ

投与スケジュール: ( 投 休 ) or (投与間隔 21 日)《 6 》クール

投与順	Rp	Total時間入力	投与時間																															
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: プライミング用/フィルター使用/【アプレピタント併用】	IV		●																					●									
2	キイトルーダ 200mg +生食 100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●																					●									
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		●																					●									
4	デキサート 9.9mg +ファモチジン 20mg +グラニセトロンバッグ 50mL 手技: 静脈内 経路: フィルター確認	30分 DIV		●																					●									
5	パクリタキセル( )mg +生食 500mL 手技: 静脈内 経路: レスタミンコーワ服用30分後から	3時間 DIV		●																					●									
6	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		●																					●									
7	カルボプラチン( )mg +生食 250mL 手技: 静脈内 経路: アプレピタント服用確認	90分 DIV		●																					●									
8	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		●																					●									
9	アバスチン( )mg +生食 100mL 手技: 静脈内 経路:	90~30分 DIV		●																					●									
10	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		●																					●									

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	婦人科がん	ルート	リザーバー
適応	子宮頸がん		
No(3桁)	008	CODE	007004001008
診療科	婦人科	医師	浅野
セット名称	★TC(CX)+BEV+Penbrolizumab		
申請年月日	令和4年10月5日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ	DIV	200 mg/body
パクリタキセル	DIV	175 mg/m <sup>2</sup>
カルボプラチン	DIV	5 AUC
		上限750mg/body
アバスタチン	DIV	15 mg/kg

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※ 令和3年8月11日改訂:DEX+ファモチジンIV⇒DIVへ

投与スケジュール: ( 投 休 ) or (投与間隔 21 日)《 6 》クール

投与順	Rp	Total時間入力	投与時間																													
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
11	ヘパリンNa 1筒 手技: 静脈内 経路:	IV	☑	●																				(●)								