化学療法レジメンセット登録用紙

領域	呼吸器がん	ルート	リザーバー
適応	NSCLC(ICI)		
No(3桁)	022	CODE	003050001022
診療科	呼吸器内科	医師	山添
セット名称	★CDDP+PEM+NIVO+IPI		
申請年月日	令和 3 年 3月1日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
オプジーボ	DIV	360 mg/body
ヤーボイ	DIV	1 mg/kg
シスプラチン	DIV	75 mg/㎡
ペメトレキセド	DIV	500 mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

総輸液量 : 2.2 L
投与時間 : 6 時間 40 分

令和5年5月改訂

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 42 日)《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Total時間入力		□	☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	☑	□	□	□	□	□	□
1	メコバラミン 500μg 2A 手技:筋注 経路:9週毎に1回投与	im		●																											
2	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミング用/フィルター使用	IV		●																					●						
3	オプジーボ 360mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●																					●						
4	生食 50mL 手技:静脈内 経路:30分あける	30分 DIV		●																					●						
5	ヤーボイ ( )mg +生食 50mL 手技:静脈内 経路:1mg/mLに希釈する	30分 DIV		●																											
6	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV		●																											
7	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg +アロカリス 1V 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●																					●						
8	ペメトレキセド ( )mg +生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV		●																					●						
9	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV		●																					●						
10	ソルデム3A 500mL +硫酸Mg補正液 8mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV		●																					●						

レジメ検討委員会

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	呼吸器がん	ルート	リザーバー
適応	NSCLC(ICI)		
No(3桁)	022	CODE	003050001022
診療科	呼吸器内科	医師	山添
セット名称	★CDDP+PEM+NIVO+IPI		
申請年月日	令和 3 年 3月1日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
オプジーボ	DIV	360 mg/body
ヤーボイ	DIV	1 mg/kg
シスプラチン	DIV	75 mg/㎡
ペメトレキセド	DIV	500 mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

総輸液量 : 2.2 L
投与時間 : 6 時間 40 分

令和5年5月改訂

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 42 日)《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Total時間入力	□	☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	☑	□	□	□	□	□	□
11	マンニットールS 300mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●																					●						
12	シスプラチン ( )mg +生食 500mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV		●																					●						
13	ソルデム3A 500mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV		●																					●						
14	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV		●																					●						
15	OS-1 1000mL 手技:静脈内 経路:3日間服用	P.O		●	●	●																			●	●	●				