化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	食道がん		
No（3桁）	016	CODE	001001001016
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	FP+Pembrolizumab（6週毎）		
申請年月日	令和　5　年　5月1日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ（6週毎）	DIV	400　mg/body
シスプラチン	DIV	80　mg/㎡
フルオロウラシル	DIV	800　mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

投与スケジュール：（　投　休）or（投与間隔　42　日）《 3 》クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Total時間入力	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1	生食　2000mL 手技：静脈内　経路：メインルート	24時間 DIV		●	●	●	●	●																	●	●	●	●	●		
2	生食　50mL 手技：静脈内　経路：側管/フィルター使用/プライミング用	IV		●																											
3	キイトルーダ　400mg　+生食　100mL 手技：静脈内　経路：側管	30分 DIV		●																											
4	生食　50mL 手技：静脈内　経路：側管	30分 DIV		●																											
5	硫酸Mg補正液　20mL　+生食　500mL 手技：静脈内　経路：側管	2時間 DIV		●																					●						
6	マンニットールS　300mL 手技：静脈内　経路：側管	30分 DIV		●																					●						
7	パロノセトロン　50mL　+デキサート　6.6mg　+アロカリス　1V 手技：静脈内　経路：側管	30分 DIV		●																					●						
8	シスプラチン（　　）mg　+生食　500mL 手技：静脈内　経路：側管/トータルで650mLを越えない	2時間 DIV		●																					●						
9	フルオロウラシル（　　）mg　+生食　500mL 手技：静脈内　経路：側管	24時間 DIV		●	●	●	●	●																	●	●	●	●	●		
10	ヘパリンNaロックシリンジ　1本 手技：静脈内　経路：	IV							●																					（●）	

レジメ検討委員会

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	食道がん		
No(3桁)	016	CODE	001001001016
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	FP+Pembrolizumab(6週毎)		
申請年月日	令和 5 年 5月1日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ(6週毎)	DIV	400 mg/body
シスプラチン	DIV	80 mg/㎡
フルオロウラシル	DIV	800 mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 42 日)《 3 》 クール

投与順	Rp	投与時間	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
		Total時間入力	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1	生食 2000mL 手技:静脈内 経路:メインルート	24時間 DIV																●	●	●	●	●									
2	生食 50mL 手技:静脈内 経路:側管/フィルター使用/プライミング用	IV																●													
3	キイトルーダ 200mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:側管	30分 DIV																●													
4	生食 50mL 手技:静脈内 経路:側管	30分 DIV																●													
5	硫酸Mg補正液 20mL +生食 500mL 手技:静脈内 経路:側管	2時間 DIV																●													
6	マンニットールS 300mL 手技:静脈内 経路:側管	30分 DIV																●													
7	パロノセトロン 50mL +デキサート 6.6mg +アロカリス 1V 手技:静脈内 経路:側管	30分 DIV																●													
8	シスプラチン( )mg +生食 500mL 手技:静脈内 経路:側管/トータルで650mLを越えない	2時間 DIV																●													
9	フルオロウラシル( )mg +生食 500mL 手技:静脈内 経路:側管	24時間 DIV																●	●	●	●	●									
10	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV																					●								

レジメ検討委員会