化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	胃がん		
No（3桁）	058	CODE	001002001058
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	★2回目以降：Trsastuzumab+mFOLFOX6【APR併用】		
申請年月日	令和 5 年 1月4日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
トラスツズマブ（2回目以降）	DIV	6 mg/kg
オキサリプラチン	DIV	85 mg/㎡
レボホリナート	DIV	200 mg/㎡
フルオロウラシル	DIV	400 mg/㎡
フルオロウラシル	CIV	2400 mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

投与スケジュール：（ 投 休 ） or （投与間隔 28 日）《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		Total時間入力	□	☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1	生食 50mL 手技： 経路：プライミング用/フィルター使用	IV		●																												(●)
2	トラスツズマブ （ ）mg +生食 250mL 手技：静脈内 経路：	30分 DIV		●	※ 2回目以降30分可																											(●)
3	グラニセトロンバッグ 50mL +デキサート 6.6mg 手技：静脈内 経路：【アプレピタント併用】	30分 DIV		●														●														(●)
4	オキサリプラチン （ ）mg +5%ブドウ糖 250mL 手技：静脈内 経路：レボホリナートと同時に	2時間 DIV		●														●														(●)
5	レボホリナート （ ）mg +5%ブドウ糖 250mL 手技：静脈内 経路：オキサリプラチンと同時に	2時間 DIV		●														●														(●)
6	フルオロウラシル （ ）mg +5%ブドウ糖 20mL 手技：静脈内 経路：オキサリプラチン・レボホリナート終了後すぐに	3分 IV		●														●														(●)
7	フルオロウラシル （ ）mg +生食 20mL 手技：静脈内 経路：トレフューザー	46hr CIV		●														●														(●)
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技：静脈内 経路：	IV		●														●														(●)
9	手技： 経路：																															
10	手技： 経路：																															

レジメ検討委員会