

化学療法レジメンセット登録用紙

1/1頁

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	大腸がん		
No(3桁)	052	CODE	001003001052
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	C-mab+mFOLFOX6【隔週・APR併用】		
申請年月日	令和4年11月21日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
アービタックス	DIV	500 mg/m ²
オキサリプラチン	DIV	85 mg/m ²
レボホリナート	DIV	200 mg/m ²
フルオロウラシル	IV	400 mg/m ²
フルオロウラシル	CIV	2400 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

			投与スケジュール: (1 投 1 休) or (投与間隔 14 日)《 》クール																												
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトンバッグ 50mL +デキサート 6.6mg 手技: 静脈内 経路:【アプレビタント併用/レスタミンコーワ5錠服用】	30分 DIV		●														●													
2	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		●														●													
3	生食 500mL +アービタックス ()mg 手技: 静脈内 経路:レスタミンコーワ服用確認	120分 DIV		●														●													
4	5%ブドウ糖 100mL 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV		●														●													
5	5%ブドウ糖 250mL +オキサリプラチン ()mg 手技: 静脈内 経路:レボホリナートと同時	2時間 DIV		●														●													
6	5%ブドウ糖 250mL +レボホリナート ()mg 手技: 静脈内 経路:オキサリプラチンと同時	2時間 DIV		●														●													
7	5%ブドウ糖 20mL +フルオロウラシル ()mg 手技: 静脈内 経路:	3分 IV		●														●													
8	フルオロウラシル ()mg +生食 60mL 手技: 静脈内 経路:トレフューザー	46時間 CIV		●														●													
9	ヘパリンNa 1筒 手技: 経路:	IV		●														●													
10	手技: 経路:																														