

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	113	CODE	004012001113
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	MBVP		
申請年月日	令和 5 年	3月6日	
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
メソトレキセート	DIV	3000 mg/m <sup>2</sup>
エトポシド	DIV	100 mg/m <sup>2</sup>
サイメリン	DIV	100 mg/m <sup>2</sup>
プレドニン	DIV	60 mg/kg

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	Total時間入力	投与スケジュール: ( 投 休 ) or (投与間隔 日) 《 》 クール																																
			投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1	生食 2000mL 手技: 静脈内 経路: メインルート	24時間 CIV		●	●	●	●	●											●	●	●	●													
2	パロノセトロンバッグ 50mL 手技: 静脈内 経路: 側管より	30分 DIV		●															●																
3	プレドニン ( )mg + 生食 100mL 手技: 経路: 側管より	30分 DIV		●	●	●	●	●																											
4	メソトレキセート ( )mg + 生食 250mL 手技: 静脈内 経路: 側管より/Total 380mLまで	3時間 DIV		●															●																
5	エトポシド ( )mg + 5%Glu 250mL 手技: 静脈内 経路: 側管より	1時間 DIV			●																														
6	サイメリン ( )mg + 生食 100mL 手技: 経路: 側管より/遮光/溶解後2hr以内に終了	30分 DIV				●																													
7	ロイコボリン 50mg 手技: 経路: MTX開始36時間後から6時間毎/初回50mg	IV			●															●															
8	ロイコボリン 15mg 手技: 経路: 6時間毎/2回目以降15mg	IV					4	4	4												4	4	4												
9	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 経路:									●														●											
10	手技: 経路:																																		