化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 録 用 紙

領域	婦人科がん	ルート	リザーバー
適応	子宮頸がん		
No(3桁)	030	CODE	007004001030
診療科	婦人科	医師	伊藤
セット名称	Cemiplimab		
申請年月日	令和 5 年 6月5日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
リブタヨ	DIV	350 mg/body

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

総輸液量 : 0.15 L
投与時間 : 0 時間 40 分

最終濃度:1-20mg/mL

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日)《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	Total時間入力	□	✓	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
				-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミング用/フィルター使用	IV			●																					(●)								
2	リブタヨ 350mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:希釈後8時間以内に投与終了すること	30分 DIV			●																					(●)								
3	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV			●																					(●)								
4	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV			●																					(●)								
5	手技: 経路:																																	
6	手技: 経路:																																	
7	手技: 経路:																																	
8	手技: 経路:																																	
9	手技: 経路:																																	
10	手技: 経路:																																	