# 化学療法レジメンセット登録用紙



| 領域 | 消化器がん | ルート | リザーバー |
|---|---|---|---|
| 適応 | 食道がん | | |
| No（3桁） | 015 | CODE | 001001001015 |
| 診療科 | 消化器内科 | 医師 | 畑中 |
| セット名称 | ▼FP+Pembrolizumab（3週毎） | | |
| 申請年月日 | 令和 5 年 5月1日 | | |
| 緊急 | | 通常 | ● |

| 抗癌剤名称 | 手技 | 標準投与量 |
|---|---|---|
| キイトルーダ（3週毎） | DIV | 200 mg/body |
| シスプラチン | DIV | 80 mg/㎡ |
| フルオロウラシル | DIV | 800 mg/㎡ |
| | | |
| | | |
| | | |

| リザーバー | 末梢 | 皮下 | 確認 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 医師 | 看護師 | 薬剤師 |
| ● | | | | | |

| 投与時間 | 総液量 3450 mL | |
|---|---|---|
| 24 時間 00 分 | $Mg^{2+}$ 8 mEq | $K^{+}$ 10 mEq |

投与スケジュール： （ 投 休 ） or （投与間隔 21 日）《 6 》 クール

| 投与順 | Rp | 投与時間 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total時間入力 | □ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 1 | 生食 50mL<br>手技：静脈内 経路：フィルター使用/プライミング用 | IV | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 2 | キイトルーダ 200mg +生食 100mL<br>手技：静脈内 経路： | 30分<br>DIV | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 3 | ソルデム3A 500mL<br>手技：静脈内 経路： | 2時間<br>DIV | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 4 | 硫酸Mg補正液 8mL +生食 500mL<br>手技：静脈内 経路： | 2時間<br>DIV | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 5 | パロノセトロン 50mL +デキサート 9.9mg +アロカリス 1V<br>手技：静脈内 経路： | 30分<br>DIV | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 5 | デキサート 6.6mg +生食 50mL<br>手技：静脈内 経路： | 30分<br>DIV | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | |
| 6 | マンニットールS 300mL<br>手技：静脈内 経路： | 30分<br>DIV | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 7 | シスプラチン（ ）mg +生食 500mL<br>手技：静脈内 経路：トータルで650mLを越えない | 2時間<br>DIV | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 8 | 生食 1000mL<br>手技：静脈内 経路： | 4時間<br>DIV | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | |
| 9 | フルオロウラシル （ ）mg +生食 500mL<br>手技：静脈内 経路： | 24時間<br>DIV | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 10 | ヘパリンNaロックシリンジ 1本<br>手技：静脈内 経路： | IV | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |

レジメ検討委員会