

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	胃がん		
No(3桁)	004	CODE	001002001004
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	MTX+5-FU交代療法		
申請年月日	平成 21 年 7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
メソトレキセート	DIV	100 mg/m <sup>2</sup>
フルオロウラシル	IV	600 mg/m <sup>2</sup>
ロイコボリン(入院)	IV	10 mg/m <sup>2</sup>
ロイコボリン(外来)	PO	1回2錠 6回程度

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師
投与時間			総液量 mL		
3 時間 50 分			Mg <sup>2+</sup> mEq	K <sup>+</sup> mEq	

MTX: 50-250mg/m<sup>2</sup>・・・軽度催吐性

ロイコボリン:レボホリナート=2:1

投与スケジュール: ( 投 休 ) or (投与間隔 7 日)《 》クール

投与順	Rp	Total時間入力	投与スケジュール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ダイアモックス 250mg +生食 50mL 手技: 静脈内 経路: DIV	10分		●																											
2	デキサート 6.6mg +生食 50mL 手技: 静脈内 経路: DIV	30分		●																											
3	メソトレキセート ( )mg +生食 50mL 手技: 静脈内 経路: DIV	10分		●																											
4	ソルデム3A 500mL +メイロン 40mL 手技: 静脈内 経路: DIV	3時間		●																											
5	フルオロウラシル ( )mg +生食 20mL 手技: 静脈内 経路: IV	3分		●																											
6	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路: IV			●																											
7	ロイコボリン ( )mg 代替:レボホリナート 手技: 静脈内 経路: IV	3分			●	●																									
8	ロイコボリン ( )mg 代替:レボホリナート 手技: 静脈内 経路: IV	3分			●	●																									
9	ロイコボリン ( )mg 代替:レボホリナート 手技: 静脈内 経路: IV	3分			●	●																									
10	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路: IV				●	●																									