

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	胃がん		
No(3桁)	056	CODE	001002001056
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	▼mFOLFOX6+NIVO		
申請年月日	令和 3 年	12月6日	
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
オプジーボ	DIV	240 mg/body
オキサリプラチン	DIV	85 mg/m <sup>2</sup>
レボホリナート	DIV	200 mg/m <sup>2</sup>
フルオロウラシル	IV	400 mg/m <sup>2</sup>
フルオロウラシル	CIV	2400 mg/m <sup>2</sup>

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師
投与時間		総液量 mL			
3 時間	10 分	Mg <sup>2+</sup> mEq	K <sup>+</sup> mEq		

※ HER2陰性

投与スケジュール: ( 投 休 ) or (投与間隔 14 日)《 》クール

投与順	Rp	Total時間入力	投与スケジュール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: フィルター使用/プライミング用	IV		●																											
2	オプジーボ 240mg +生食 100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●																											
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		●																											
4	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●																											
5	オキサリプラチン ( )mg +5%ブドウ糖 250mL 手技: 静脈内 経路: レボホリナートと同時に	2時間 DIV		●																											
6	レボホリナート ( )mg +5%ブドウ糖 250mL 手技: 静脈内 経路: オキサリプラチンと同時に	2時間 DIV		●																											
7	フルオロウラシル ( )mg +5%ブドウ糖 20mL 手技: 静脈内 経路: Rp5.6終了後すぐに	3分 IV		●																											
8	フルオロウラシル ( )mg +生食 手技: 静脈内 経路: トレフューザー	46時間 CIV		●																											
9	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 経路:	IV		●																											
10	手技: 経路:																														