化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	大腸がん		
No（3桁）	002	CODE	001003001002
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	FOLFIRI		
申請年月日	平成 22 年 6月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
イリノテカン	DIV	150 mg/㎡
レボホリナート	DIV	200 mg/㎡
フルオロウラシル	IV	400 mg/㎡
フルオロウラシル	CIV	2400 mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

投与時間	総液量 mL	
2 時間 30 分	Mg^{2+} mEq	K^{+} mEq

投与スケジュール：（ 投 休 ）or（投与間隔 14 日）《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Total時間入力	□	☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg 手技：静脈内 経路：	30分 DIV		●														●（）													
2	イリノテカン （ ）mg +生食 500mL 手技：静脈内 経路：遮光/レボホリナートと同時に	2時間 DIV		●														●（）													
3	レボホリナート （ ）mg +生食 250mL 手技：静脈内 経路：イリノテカンと同時に	2時間 DIV		●														●（）													
4	フルオロウラシル （ ）mg +生食 20mL 手技：静脈内 経路：イリノテカン・レボホリ終了後すぐに	3分 IV		●														●（）													
5	フルオロウラシル（ ）mg +生食 20mL 3A 手技：静脈内 経路：トレフューザー	46時間 CIV		●														●（）													
6	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技： 経路：	IV		●														●（）													
7	手技：静脈内 経路：																														
8	手技：静脈内 経路：																														
9	手技：静脈内 経路：																														
10	手技：静脈内 経路：																														