

化学療法レジメンセット登録用紙

| | | | |
|--------|---------|------|--------------|
| 領域 | 消化器がん | ルート | リザーバー |
| 適応 | 大腸がん | | |
| No(3桁) | 005 | CODE | 001003001005 |
| 診療科 | 消化器内科 | 医師 | 畑中 |
| セット名称 | IRIS | | |
| 申請年月日 | 平成 22 年 | 6月7日 | |
| 緊急 | | 通常 | ● |

| | | |
|--------|-----|-----------------------|
| 抗癌剤名称 | 手技 | 標準投与量 |
| イリノテカン | DIV | 100 mg/m ² |
| エスワン | PO | 80 mg/m ² |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | | | |
|-----------|----|----|----------------------|--------------------|-----|
| リザーバー | 末梢 | 皮下 | 確認 | | |
| ● | | | 医師 | 看護師 | 薬剤師 |
| | | | | | |
| 投与時間 | | | 総液量 mL | | |
| 2 時間 00 分 | | | Mg ²⁺ mEq | K ⁺ mEq | |

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 28 日)《 》 クール

| 投与順 | Rp | Total時間入力 | 投与スケジュール | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg 手技: 静脈内 経路: | 30分 DIV | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | イリノテカン ()mg +生食 500mL 手技: 静脈内 経路: 遮光 | 90分 DIV | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路: | IV | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | エスワン ()mg (朝 __錠 / 夕 __錠) 手技: 内服 経路: 2投2休 | 1日2回 PO | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 手技: 静脈内 経路: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 手技: 静脈内 経路: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 手技: 静脈内 経路: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 手技: 静脈内 経路: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 手技: 静脈内 経路: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 手技: 静脈内 経路: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |