化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	大腸がん		
No(3桁)	006	CODE	001003001006
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	mFOLFOX6+BEV		
申請年月日	令和 2 年 12月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ベバシズマブ	DIV	5 mg/kg
オキサリプラチン	DIV	85 mg/㎡
レボホリナート	DIV	200 mg/㎡
フルオロウラシル	IV	400 mg/㎡
フルオロウラシル	CIV	2400 mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認 医師	確認 看護師	確認 薬剤師
●					

投与時間	総液量 mL	
4 時間 30 分	Mg^{2+} mEq	K^{+} mEq

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 14 日)《 》 クール

Total時間入力: □ ☑ □

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 50mL 手技: 経路:プライミング用	IV		●														(●)													
2	ベバシズマブ ( )mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	90-30分 DIV		●														(●)													
3	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●														(●)													
4	オキサリプラチン ( )mg +5%ブドウ糖 250mL 手技:静脈内 経路:レボホリナートと同時に	2時間 DIV		●														(●)													
5	レボホリナート ( )mg +5%ブドウ糖 250mL 手技:静脈内 経路:オキサリプラチンと同時に	2時間 DIV		●														(●)													
6	フルオロウラシル ( )mg +5%ブドウ糖 20mL 手技:静脈内 経路:ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ･ﾚﾎﾞﾎﾘ終了後すぐに	3分 IV		●														(●)													
7	フルオロウラシル ( )mg +生食 20mL 3A 手技:静脈内 経路:トレフューザー	46時間 CIV		●														(●)													
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV		●														(●)													
9	手技:静脈内 経路:																														
10	手技:静脈内 経路:																														