

化学療法レジメンセット登録用紙

| | | | |
|--------|-------------|-------|--------------|
| 領域 | 消化器がん | ルート | リザーバー |
| 適応 | 大腸がん | | |
| No(3桁) | 007 | CODE | 001003001007 |
| 診療科 | 消化器内科 | 医師 | 畑中 |
| セット名称 | FOLFIRI+BEV | | |
| 申請年月日 | 令和 2 年 | 12月7日 | |
| 緊急 | | 通常 | ● |

| 抗癌剤名称 | 手技 | 標準投与量 |
|----------|-----|------------------------|
| ベバシズマブ | DIV | 5 mg/kg |
| イリノテカン | DIV | 150 mg/m ² |
| レボホリナート | DIV | 200 mg/m ² |
| フルオロウラシル | IV | 400 mg/m ² |
| フルオロウラシル | CIV | 2400 mg/m ² |

| | | | | | |
|-------|------|----------------------|--------------------|-----|-----|
| リザーバー | 末梢 | 皮下 | 確認 | | |
| ● | | | 医師 | 看護師 | 薬剤師 |
| 投与時間 | | 総液量 mL | | | |
| 4 時間 | 00 分 | Mg ²⁺ mEq | K ⁺ mEq | | |

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 14 日)《 》クール

| 投与順 | Rp | Total時間入力 | 投与スケジュール | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| | | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| 1 | 生食 50mL 手技: 経路:プライミング用 | IV | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ベバシズマブ ()mg +生食 100mL 手技: 静脈内 経路: | 90-30分 DIV | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg 手技: 静脈内 経路: | 30分 DIV | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | イリノテカン ()mg +生食 500mL 手技: 静脈内 経路: 遮光/レボホリナートと同時に | 2時間 DIV | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | レボホリナート ()mg +生食 250mL 手技: 静脈内 経路: イリノテカンと同時に | 2時間 DIV | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | フルオロウラシル ()mg +生食 20mL 手技: 静脈内 経路: イリノテカン・レボホリナート終了後すぐに | 3分 IV | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | フルオロウラシル()mg +生食 20mL 3A 手技: 静脈内 経路:トレフューザー | 46時間 CIV | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路: | IV | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 手技: 静脈内 経路: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 手技: 静脈内 経路: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |