

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	大腸がん		
No(3桁)	019	CODE	001003001019
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	mFOLFOX6+Pmab		
申請年月日	平成 22 年	9月14日	
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ベクティビックス	DIV	6 mg/kg
オキサリプラチン	DIV	85 mg/m ²
レボホリナート	DIV	200 mg/m ²
フルオロウラシル	IV	400 mg/m ²
フルオロウラシル	CIV	2400 mg/m ²

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師
投与時間			総液量 mL		
3 時間	30 分		Mg ²⁺ mEq	K ⁺ mEq	

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 14 日)《 》クール

投与順	Rp	Total時間入力	投与スケジュール																													
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: フィルター使用/プライミング用	IV		●																												
2	ベクティビックス ()mg +生食 100mL 手技: 静脈内 経路: 希釈後6時間以内に投与終了すること	60分 DIV		●																												
3	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●																												
4	オキサリプラチン ()mg +5%ブドウ糖 250mL 手技: 静脈内 経路: レボホリナートと同時に	2時間 DIV		●																												
5	レボホリナート ()mg +5%ブドウ糖 500mL 手技: 静脈内 経路: オキサリプラチンと同時に	2時間 DIV		●																												
6	フルオロウラシル ()mg +5%ブドウ糖 20mL 手技: 静脈内 経路: オキサリプラチン・レボホリ終了後すぐに	3分 IV		●																												
7	フルオロウラシル ()mg +生食 20mL 3A 手技: 静脈内 経路: トレフューザー	46時間 CIV		●																												
8	ヘパリンNa 1筒 手技: 経路:	IV		●																												
9	手技: 静脈内 経路:																															
10	手技: 静脈内 経路:																															