化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	大腸がん		
No（3桁）	023	CODE	001003001023
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	2回目以降：mFOLFOX6+Cmab		
申請年月日	平成 23 年 10月11日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
アービタックス	DIV	250 mg/㎡
オキサリプラチン	DIV	85 mg/㎡
レボホリナート	DIV	200 mg/㎡
フルオロウラシル	IV	400 mg/㎡
フルオロウラシル	CIV	2400 mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

投与時間	総液量 mL	
4 時間 00 分	Mg^{2+} mEq	K^{+} mEq

投与スケジュール：（ 投 休 ）or（投与間隔 14 日）《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	−1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Total時間入力	□	☑	□	□	□	□	□	□	☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg 手技：静脈内 経路：開始時にレスタミンコーワ5錠服用	30分 DIV		●														（●）													
2	生食50mL 手技： 経路：プライミング用	IV									●														（●）						
3	アービタックス （ ）mg +生食 250mL 手技：静脈内 経路：ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ5錠服用30分後より	60分 DIV		●	全量で250mLにする						●							（●）							（●）						
4	生食 50mL 手技： 経路：経過観察	30分 DIV		●							●							（●）							（●）						
5	オキサリプラチン （ ）mg +5%ブドウ糖 250mL 手技：静脈内 経路：レボホリナートと同時に	2時間 DIV		●														（●）													
6	レボホリナート （ ）mg +5%ブドウ糖 250mL 手技：静脈内 経路：オキサリプラチンと同時に	2時間 DIV		●														（●）													
7	フルオロウラシル （ ）mg +5%ブドウ糖 20mL 手技：静脈内 経路：ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ・ﾚﾎﾞﾎﾘ終了後すぐに	3分 IV		●														（●）													
8	フルオロウラシル （ ）mg +生食 20mL 3A 手技：静脈内 経路：トレフューザー	46時間 CIV		●														（●）													
9	ヘパリンNa 1筒 手技： 経路：	IV		●							●							（●）							（●）						
10	手技： 経路：																														

レジメ検討委員会