化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	大腸がん		
No（3桁）	043	CODE	001003001043
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	LV5/FU2+Pmab		
申請年月日	平成 28 年 7月13日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
レボホリナート	DIV	200 mg/㎡
フルオロウラシル	IV	400 mg/㎡
フルオロウラシル	CIV	2400 mg/㎡
ベクティビックス	DIV	6 mg/kg

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

投与時間	総液量 mL	
3 時間 30 分	Mg^{2+} mEq	K^{+} mEq

投与スケジュール： （ 投 休 ） or （投与間隔 14 日）《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	−1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Total時間入力		□	☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1	生食 50mL 手技： 経路：プライミング用/フィルター使	IV		●														（●）													
2	ベクティビックス （ ）mg +生食 100mL 手技： 経路：希釈後6hr以内に投与終了すること	60分 DIV		●	全量で100mLにする													（●）													
3	デキサート 6.6mg +生食 50mL 手技：静脈内 経路：	30分 DIV		●														（●）													
4	レボホリナート （ ）mg +5%ブドウ糖 250mL 手技：静脈内 経路：	2時間 DIV		●														（●）													
5	フルオロウラシル （ ）mg +5%ブドウ糖 20mL 手技：静脈内 経路：レボホリ終了後すぐにIV	3分 IV		●														（●）													
6	フルオロウラシル （ ）mg +生食 20mL 3A 手技：静脈内 経路：トレフューザー	46時間 CIV		●														（●）													
7	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技： 経路：			●														（●）													
8	手技： 経路：																														
9	手技： 経路：																														
10	手技： 経路：																														