化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	大腸がん		
No(3桁)	037	CODE	001003001037
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	LV5/FU2+BEV		
申請年月日	令和 2 年 12月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
レボホリナート	DIV	200 mg/㎡
フルオロウラシル	IV	400 mg/㎡
フルオロウラシル	CIV	2400 mg/㎡
ベバシズマブ	DIV	5 mg/kg

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

投与時間	総液量 mL	
2 時間 30 分	Mg^{2+} mEq	K^{+} mEq

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 14 日)《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Total時間入力		□	☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1	生食 50mL 手技: 経路:プライミング用	IV		●														(●)													
2	ベバシズマブ ( )mg +生食 100mL 手技: 経路:	30-90分 DIV		●														(●)													
3	デキサート 6.6mg +生食 50mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●														(●)													
4	レボホリナート ( )mg +5%ブドウ糖 250mL 手技:静脈内 経路:	2時間 DIV		●														(●)													
5	フルオロウラシル ( )mg +5%ブドウ糖 20mL 手技:静脈内 経路:レボホリナート終了後すぐに	3分 IV		●														(●)													
6	フルオロウラシル ( )mg +生食 20mL 3A 手技:静脈内 経路:トレフューザー	46時間 CIV		●														(●)													
7	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 経路:	IV		●														(●)													
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														