

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	大腸がん		
No(3桁)	038	CODE	001003001038
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	FOLFIRI+RAM		
申請年月日	平成 28 年 11月9日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
サイラムザ	DIV	8 mg/kg
イリノテカン	DIV	150 mg/m <sup>2</sup>
レボホリナート	DIV	200 mg/m <sup>2</sup>
フルオロウラシル	IV	400 mg/m <sup>2</sup>
フルオロウラシル	CIV	2400 mg/m <sup>2</sup>

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師
投与時間		総液量 mL			
3 時間	50 分	Mg <sup>2+</sup> mEq	K <sup>+</sup> mEq		

※ RAMの投与速度25mg/minを超えない

※ RAM初回60分。2回目以降30分で投与可。

投与スケジュール: ( 投 休 ) or (投与間隔 14 日)《 》クール

投与順	Rp	Total時間入力	投与スケジュール																														
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg 手技: 静脈内 <small>経路: フィルター使用/開始時にレスタミンコーワ5錠服用</small>	30分 DIV		●														●															
2	サイラムザ ( )mg +生食 250mL 手技: 静脈内 <small>経路: Total 250mL</small>	60-30分 DIV		●														●															
3	生食 50mL 手技: <small>経路:</small>	10分 DIV		●														●															
4	イリノテカン ( )mg +生食 500mL 手技: 静脈内 <small>経路: 遮光/レボホリナートと同時に</small>	2時間 DIV		●														●															
5	レボホリナート ( )mg +生食 250mL 手技: 静脈内 <small>経路: イリノテカンと同時に</small>	2時間 DIV		●														●															
6	フルオロウラシル ( )mg +生食 20mL 手技: 静脈内 <small>経路: 5.6終了後すぐに</small>	3分 IV		●														●															
7	フルオロウラシル ( )mg +生食 20mL 3A 手技: 静脈内 <small>経路: トレフューザー</small>	46時間 CIV		●														●															
8	ヘパリンNa 1筒 手技: <small>経路:</small>	IV		●														●															
9	手技: <small>経路:</small>																																