

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	動注
適応	肝がん		
No(3桁)	004	CODE	001004003004
診療科	消化器内科	医師	山本(義)
セット名称	LFP①		
申請年月日	平成 21 年 7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
アイエーコール	CIA	50 mg/body
フルオロウラシル	CIA	250~500 mg/body

動注	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師
投与時間		総液量			
時間	分	Mg <sup>2+</sup>	mEq	K <sup>+</sup>	mEq

投与スケジュール: ( 投 休 ) or (投与間隔 7 日)《 》クール

※アイエーコールは20mLのシリンジにつめる

投与順	Rp	投与時間	Total時間入力																												
			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																										
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 動脈内 経路:			●							( ● )																				
2	アイエーコール 50mg +生食 50mL 手技: 動脈内 経路: 10mL/時間/フルオロウラシルと同時に	1時間で		●	●	●	●	●			( ● )	( ● )	( ● )	( ● )																	
3	フルオロウラシル 500mg +生食 40mL 手技: 動脈内 経路: 10mL/時間でアイエーコールと同時に	5時間で		●	●	●	●	●			( ● )	( ● )	( ● )	( ● )																	
4	ノボ・ヘパリン 1V +生食 40mL (全量50mL) 手技: 動脈内 経路: 2mL/時間で5-FU終了後より	19時間で		●	●	●	●				( ● )	( ● )	( ● )																		
5	ノボ・ヘパリン 5mL 手技: 動脈内 経路:							●																							
6	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 動脈内 経路:							●																							
7	手技: 経路:																														
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														