

化学療法レジメンセット登録用紙

1/1頁

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	外来化学療法		
No(3桁)	017	CODE	004001001017
診療科	血液内科	医師	伊東
セット名称	Pola+CHP		
申請年月日	令和 5 年 2月6日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ポライビー	DIV	1.8 mg/kg
ドキシソルビン	DIV	50 mg/m ²
エンドキサン	DIV	750 mg/m ²
プレドニン	p.o	100 mg/body

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師
投与時間		総液量 mL			
5 時間 30 分		Mg ²⁺ mEq	K ⁺ mEq		

※ 30mg/V:DW 1.8mLで溶解、140mg/V:DW 7.2mLで溶解(20mg/mL)

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日) 《 》 クール

※ ポライビー:希釈後最終濃度:0.72mg/mL~2.70mg/mL

※ ポライビー：希釈後最終濃度：0.72mg/mL～2.70mg/mL			Total時間入力																												
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロンバッグ 50mL 手技：静脈内 経路：前投服用/フィルター使用	30分 DIV		●																					(●)						
2	ポライビー ()mg +生食 50mL +注射用水 20mL 手技：静脈内 経路：DW溶解(20mg/mL)/前投服用30分後	90-30分 DIV		●	90分、2回目以降は30分可																				(●)						
3	ドキシソルビン ()mg +生食 100mL 手技：静脈内 経路：	60分 DIV		●																					(●)						
4	エンドキサン ()mg +生食 250mL 手技：静脈内 経路：溶解後6時間以内に投与終了する事	3時間 DIV		●																					(●)						
5	生食 50mL 手技：静脈内 経路：	500mL/hr DIV		●																					(●)						
6	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技：静脈内 経路：	IV		●																					(●)						
7	プレドニン錠 20錠 毎食後 (朝__錠/昼__錠/夕__錠) 手技：内服 経路：	p.o		●	●	●	●	●																	(●)						
8	手技： 経路：																														
9	手技： 経路：																														
10	手技： 経路：																														