化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	外来化学療法		
No（3桁）	018	CODE	004001001018
診療科	血液内科	医師	伊東
セット名称	Pola+BR【外来用】		
申請年月日	令和 4 年 9月5日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
リツキシマブ	DIV	375 mg/㎡
ポライビー	DIV	1.8 mg/kg
ベンダムスチン	DIV	90 mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

投与時間	総液量 mL	
4 時間 00 分	Mg^{2+} mEq	K^{+} mEq

※ 30mg/V：DW 1.8mLで溶解、140mg/V：DW 7.2mLで溶解（20mg/mL）

※ ポライビー：希釈後最終濃度：0.72mg/mL～2.70mg/mL

投与スケジュール：（ 投 休 ）or（投与間隔 21 日）《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	−1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Total時間入力	□	☑	☑	☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1	生食 50mL 手技：静脈内 経路：プライミング用/前投薬服用	IV		●																					●（）						
2	リツキシマブ（ ）mg +生食 500mL 手技：静脈内 経路：前投服用30分後/1mg/mLに希釈	4時間 DIV		●																					●（）						
3	グラニセトロンバッグ 50mL 手技：静脈内 経路：フィルター使用	30分 DIV			●	●																				●（）	●（）				
4	ベンダムスチン（ ）mg +生食 50mL 手技：静脈内 経路：希釈後：6hr以内（室温）/24時間以内（冷所）	10分 DIV			●	●																				●（）	●（）				
5	ポライビー（ ）mg +注射用水 +生食 50mL 手技：静脈内 経路：DW溶解（20mg/mL）/前投服用30分後	90−30分 DIV			●																					●（）					
6	生食 50mL 手技：静脈内 経路：	500mL/hr DIV		●	●	●																			●（）	●（）	●（）				
7	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技：静脈内 経路：	IV		●	●	●																			●（）	●（）	●（）				
8	手技： 経路：																														
9	手技： 経路：																														
10	手技： 経路：																														