

化学療法レジメンセット登録用紙

1/1頁

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	外来化学療法		
No(3桁)	019	CODE	004001001019
診療科	血液内科	医師	伊東
セット名称	Pola+BR(2日)【外来用】		
申請年月日	令和 4 年 9月5日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
リツキシマブ	DIV	375 mg/m ²
ポライビー	DIV	1.8 mg/kg
ベンダムスチン	DIV	90 mg/m ²

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師
投与時間			総液量 mL		
時間	分		Mg ²⁺ mEq	K ⁺ mEq	

※ 30mg/V:DW 1.8mLで溶解、140mg/V:DW 7.2mLで溶解(20mg/mL)

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日)《 》クール

※ ポライビー:希釈後最終濃度:0.72mg/mL~2.70mg/mL

Total時間入力		☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐																																	
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
1	グラニセトロンバッグ 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●																				(●)	(●)									
2	ベンダムスチン ()mg +生食 50mL 手技: 静脈内 経路: 希釈後: 6hr以内(室温)/24時間以内(冷所)	10分 DIV		●	●																				(●)	(●)									
3	ポライビー ()mg +注射用水 60mL +生食 50mL 手技: 静脈内 経路: DW溶解(20mg/mL)/前投②服用30分後	90-30分 DIV		●	初回90分、2回目以降は30分可																								(●)						
4	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: セット交換/プライミング用	IV		●																					(●)										
5	リツキシマブ ()mg + 生食 500mL 手技: 静脈内 経路: 前投①服用30分後/ 1mg/mLに希釈	4時間 DIV		●																					(●)										
6	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	500mL/hr DIV		●	●																				(●)	(●)									
7	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●	●																				(●)	(●)									
8	手技: 経路:																																		
9	手技: 経路:																																		
10	手技: 経路:																																		