化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	外来化学療法		
No（3桁）	020	CODE	004001001020
診療科	血液内科	医師	伊東
セット名称	A+AVD【外来用】		
申請年月日	令和　6　年　8月13日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ドキソルビシン	DIV	25　mg/㎡
エクザール（10mgまで）	DIV	6　mg/㎡
ダカルバジン	DIV	375　mg/㎡
アドセトリス	DIV	1.2　mg/kg

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

投与時間	総液量　mL	
2　時間　45　分	Mg^{2+}　mEq	K^{+}　mEq

投与スケジュール：（　投　休）or（投与間隔　28　日）《　》クール

投与順	Rp	投与時間	−1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Total時間入力	□	☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1	グラニセトロンバッグ　50mL 手技：静脈内　経路：	30分 DIV		●														●（）													
2	ドキソルビシン（　）mg　+生食　100mL 手技：静脈内　経路：	30分 DIV		●														●（）													
3	エクザール（　）mg　+生食　50mL 手技：静脈内　経路：	15分 DIV		●														●（）													
4	ダカルバジン（　）mg　+注射用水　60mL　+生食　500mL 手技：静脈内　経路：遮光/1VをDW10mLで溶解	60分 DIV		●														●（）													
5	生食　50mL 手技：静脈内　経路：	500mL/hr DIV		●														●（）													
6	アドセトリス（　）mg　+生食　150mL　+注射用水　40mL 手技：静脈内　経路：ダカルバジン投与後1hr以内に開始	30分 DIV		●														●（）													
7	生食　50mL 手技：静脈内　経路：	500mL/hr DIV		●														●（）													
8	ヘパリンNaロックシリンジ　1本 手技：静脈内　経路：	IV		●														●（）													
9	手技：　経路：																														
10	手技：　経路：																														

レジメ検討委員会