

化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ャ ッ ト 登 録 用 紙

1/2頁

領域	婦人科がん	ルート	リザーバー
適応	子宮頸がん		
No(3桁)	048	CODE	007003001048
診療科	婦人科	医師	伊藤
セット名称	▼wCDDP(short)+Pembro		
申請年月日	令和 6 年 11月25日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ	DIV	200 mg/body
シスプラチン	DIV	40 mg/m ²

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師
投与時間		総液量	1750 mL		
4 時間 10 分		Mg ²⁺ 8 mEq	K ⁺ 20 mEq		

			投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 7 日)《 6 》 クール																												
			Total時間入力	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: プライミング用/フィルター使用	DIV		●																					●						
2	キイトルーダ 200mg +生食 100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●																					●						
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		●																					●						
4	硫酸Mg補正液 8mL +ソルデム 3A 500mL 手技: 静脈内 経路: OS-1 1L 3日間併用	60分 DIV		●							●							●							●						
5	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg +アロカリス 1V 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●							●							●							●						
6	シスプラチン ()mg +生食 500mL 手技: 静脈内 経路:	60分 DIV		●							●							●							●						
7	フロセミド 20mg 手技: 静脈内 経路: 側管から	IV		●							●							●							●						
8	ソルデム 3A 500mL 手技: 静脈内 経路:	60分 DIV		●							●							●							●						
9	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●							●							●							●						
10	OS-1 1000mL 手技: 静脈内 経路:	P.O		●	●	●					●	●	●					●	●	●					●	●	●				

2/2頁

リザーバー	末梢	皮下	確認			
●			医師	看護師	薬剤師	

投与時間			総液量 1750 mL			
4	時間	10 分	Mg ²⁺	8 mEq	K ⁺	20 mEq

レジメ検討委員会