

化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ャ ッ ト 登 録 用 紙

1/1頁

領域	婦人科がん	ルート	リザーバー
適応	子宮体がん		
No(3桁)	093	CODE	007003001093
診療科	婦人科	医師	伊藤
セット名称	▼TC+Pembro		
申請年月日	令和 7 年	1月6日	
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ	DIV	200 mg/body
パクリタキセル	DIV	175 mg/m ²
カルボプラチン	DIV	5 AUC 上限750mg/body

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師
投与時間			総液量 1100 mL		
6 時間	00 分		Mg ²⁺ mEq	K ⁺ mEq	

			投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日)《 6 》 クール																												
			Total時間入力	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: プライミング用/フィルター使用	DIV		●																					(●)						
2	キイトルーダ 200mg +生食 100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●																					(●)						
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: 経過観察	10分 DIV		●																					(●)						
4	グラニセトロンバッグ 50mL +デキサート19.8mg +ファモチジン20mg 手技: 静脈内 経路: アプレピタント併用/開始時レスタミンコーワ錠を5錠内服	30分 DIV		●																					(●)						
5	パクリタキセル()mg +生食 500mL 手技: 静脈内 経路:	3時間 DIV		●																					(●)						
6	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		●																					(●)						
7	カルボプラチン()mg +生食 250mL 手技: 静脈内 経路:	90分 DIV		●																					(●)						
8	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	500mL/hr DIV		●																					(●)						
9	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●																					(●)						
10	手技: 経路:																														