

化学療法レジメンセット登録用紙

1/1頁

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	胃がん		
No(3桁)	069	CODE	001002001069
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	▼CAPOX+Pembrolizumab		
申請年月日	令和 7 年 3月3日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ	DIV	200 mg/body
オキサリプラチン	DIV	130 mg/m ²
カペシタビン	PO	2000 mg/m ²

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師
投与時間		総液量 mL			
3 時間 15 分		Mg ²⁺ mEq	K ⁺ mEq		

			投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日)《 》クール																													
			Total時間入力	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: フィルター使用/プライミング用	IV		●																					(●)							
2	キイトルーダ 200mg +生食 100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●																					(●)							
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: 経過観察	10分 DIV		●																					(●)							
4	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●																					(●)							
5	オキサリプラチン ()mg +5%ブドウ糖 250mL 手技: 静脈内 経路:	2時間 DIV		●																					(●)							
6	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	500mL/hr DIV		●																					(●)							
7	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●																					(●)							
8	カペシタビン ()mg 手技: 内服 経路: 1000mg/m ² /回	1日2回 PO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	
9	手技: 経路:																															
10	手技: 経路:																															