

化学療法レジメンセット登録用紙

1/1頁

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	胃がん		
No(3桁)	075	CODE	001002001075
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	▼初回:CAPOX+Tmab+Pembro		
申請年月日	令和 7 年 6月2日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ	DIV	200 mg/body
トラスツズマブ	DIV	8 mg/kg
オキサリプラチン	DIV	130 mg/m ²
カペシタビン	PO	2000 mg/m ²

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師
投与時間			総液量 mL		
4 時間 40 分			Mg ²⁺ mEq	K ⁺ mEq	

			投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日)《 》クール																													
			Total時間入力	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	生食 50mL 手技:静脈内 経路:フィルター使用/プライミング用	IV		●																					(●)							
2	キイトルーダ 200mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●																					(●)							
3	生食 50mL 手技:静脈内 経路:経過観察	10分 DIV		●																					(●)							
4	トラスツズマブ ()mg +生食 250mL +注射用水 40mL 手技:静脈内 経路:	90分 DIV		●																					(●)							
5	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●																					(●)							
6	オキサリプラチン ()mg +5%ブドウ糖 250mL 手技:静脈内 経路:	2時間 DIV		●																					(●)							
7	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	500mL/hr DIV		●																					(●)							
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV		●																					(●)							
9	カペシタビン ()mg 手技:内服 経路:1000mg/m ² /回	1日2回 PO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	
10	手技: 経路:																															