化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	胃がん		
No(3桁)	078	CODE	001002001078
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	▼2回目以降:SOX+Tmab+Pembro		
申請年月日	令和 7 年 6月9日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ	DIV	200 mg/body
トラスツズマブ	DIV	6 mg/kg
オキサリプラチン	DIV	100 mg/㎡
エスワン	PO	80 mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

投与時間	総液量 mL	
3 時間 40 分	Mg^{2+} mEq	K^{+} mEq

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日)《 》クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Total時間入力	□	☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1	生食 50mL 手技:静脈内 経路:フィルター使用/プライミング用	IV		●																					(●)						
2	キイトルーダ 200mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●																					(●)						
3	生食 50mL 手技:静脈内 経路:経過観察	10分 DIV		●																					(●)						
4	トラスツズマブ ( )mg +生食 250mL +注射用水 40mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●																					(●)						
5	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●																					(●)						
6	オキサリプラチン ( )mg +5%ブドウ糖 250mL 手技:静脈内 経路:	2時間 DIV		●																					(●)						
7	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	500mL/hr DIV		●																					(●)						
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV		●																					(●)						
9	エスワン ( )mg 手技:内服 経路:40mg/㎡/回	1日2回 PO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
10	手技: 経路:																														

レジメ検討委員会