化学療法レジメンセット登録用紙

領域	乳がん	ルート	リザーバー
適応	乳がん（TNBC）		
No（3桁）	069	CODE	002001001069
診療科	乳腺外科	医師	鈴木
セット名称	Sacituzumab Govitecan		
申請年月日	令和 6 年 12月10日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
トロデルビ	DIV	10 mg/kg

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

投与時間	総液量 mL	
4 時間 00 分	Mg^{2+} mEq	K^{+} mEq

前投薬：レスタミンコーワ3T+ファモチジン20mg1T+カロナール200mg4T

投与スケジュール：（ 投 休 ）or （投与間隔 21 日）《 》クール

投与順	Rp	投与時間	−1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Total時間入力	□	☑	□	□	□	□	□	□	☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	☑	□	□	□	□	□	□
1	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg +アロカリス 1V 手技：静脈内 経路：前投薬服用	30分 DIV		●							●														（●）						
2	トロデルビ （ ）mg +生食 250mL 手技：静脈内 経路：遮光/生食20mLで溶解（10mg/mL）	3時間※ DIV		●							●														（●）						
3	生食 100mL 手技：静脈内 経路：経過観察	30分 DIV		●							●														（●）						
4	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技：静脈内 経路：	IV		●							●														（●）						
5	手技： 経路：																														
6	手技： 経路：																														
7	手技： 経路：																														
8	手技： 経路：																														
9	手技： 経路：																														
10	手技： 経路：																														

トロデルビ
・2回目以降は1～2時間で投与可能
・希釈後8時間以内に投与終了すること
・希釈後濃度は1.1～3.4mg/mLとすること
※投与量
300mg未満→NS 100mL
800mg以上→NS 500mL