

化学療法レジメンセット登録用紙

1/1頁

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【AML】急性骨髄性白血病		
No(3桁)	032	CODE	004002001032
診療科	血液内科	医師	伊東
セット名称	Vyxeos induction①【適応:要確認】		
申請年月日	令和 7 年	1月28日	
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ビキセオス	DIV	100 単位/m ²

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師
投与時間		総液量 mL			
2 時間	00 分	Mg ²⁺ mEq	K ⁺ mEq		

溶解後:遮光、2-8℃で4hr以内に投与開始

1ユニット:DNR 0.44mg+AraC 1mg

溶解後:遮光、2-8℃で4hr以内に投与開始			投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 5-8週 日)《 》 クール																																				
1ユニット:DNR 0.44mg+AraC 1mg			Total時間入力	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
1	グラニセトロンバッグ 50mL 手技: 静脈内 経路: ★フィルター不可	30分 DIV		●		●		●																															
2	ビキセオス ()ユニット +5%ブドウ糖 500mL +注射用水 40mL 手技: 静脈内 経路: 1VをDW19mLで溶解(5U/mL)	90分 DIV		●		●		●		1VをDW 19mLで溶解→100ユニット/20mL→5U/mL																													
3	5%ブドウ糖 100mL 手技: 静脈内 経路:	500mL/hr DIV		●		●		●																															
4	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●		●		●																															

最大2サイクルまで

※ 1サイクルで寛解に未到達の場合、1サイクル目の2-5週間後に2サイクル目として、Vyxeos Induction②(追加分)を点滴静注

※ 2サイクル目はd1、3に点滴静注する

適応: 【高リスクAML患者】の定義 ➡ WHO分類(2008年版又は2017年版)におけるAMLのうち以下のいずれかに該当する患者とした。

- ・ 治療関連AML
- ・ 骨髄異形成症候群(MDS)の既往歴があるAML(以下の①～③のいずれかに該当する患者)
 - ①過去にMDSと診断されたことがある患者
 - ②1系統以上に10%以上の異形成、又は10%以上の巨核球系異形成がある患者
 - ③いずれの系統でも異形成が10%未満であるが、MDSに特徴的なクローナルな細胞遺伝学的異常を有する患者
- ・ 骨髄異形成関連変化を伴うAML(AML-MRC)と診断できる細胞遺伝学的異常を有するAML
- ・ 慢性骨髄単球性白血病(CMML)の既往があるAML