

化学療法レジメンセット登録用紙

1/1頁

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【AML】急性骨髄性白血病		
No(3桁)	033	CODE	004002001033
診療科	血液内科	医師	伊東
セット名称	Vyxeos Induction(①の追加分)		
申請年月日	令和 7 年	1月28日	
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ビキセオス	DIV	100 単位/m ²

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師
投与時間		総液量 mL			
2 時間	00 分	Mg ²⁺ mEq	K ⁺ mEq		

溶解後:遮光、2-8℃で4hr以内に投与開始

1ユニット:DNR 0.44mg+AraC 1mg

溶解後：遮光、2-8℃で4hr以内に投与開始			投与スケジュール：（ 投 休 ） or （投与間隔 5-8週 日）《 》 クール																												
1ユニット：DNR 0.44mg+AraC 1mg			Total時間入力	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロンバッグ 50mL 手技：静脈内 経路：★フィルター不可	30分 DIV		●		●																									
2	ビキセオス（ ）ユニット +5%ブドウ糖 500mL +注射用水 40mL 手技：静脈内 経路：1VをDW19mLで溶解（5U/mL）	90分 DIV		●		●																									
3	5%ブドウ糖 100mL 手技：静脈内 経路：	500mL/hr DIV		●		●																									
4	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技：静脈内 経路：	IV		●		●																									
5	手技： 経路：																														

ビキセオス

1VをDW 19mLで溶解→100ユニット/20mL→5U/mL

最大2サイクルまで

※ 1サイクルで寛解に未到達の場合、1サイクル目の2-5週間後に2サイクル目として Vyxeos Induction②(追加分)を点滴静注

※ 2サイクル目はd1、3に点滴静注する