

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【AML】急性骨髄性白血病		
No(3桁)	034	CODE	004002001034
診療科	血液内科	医師	伊東
セット名称	Vyxeos Consolidation		
申請年月日	令和 7 年	1月28日	
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ビキセオス	DIV	65 単位/m ²

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師
投与時間			総液量 mL		
2 時間	00 分		Mg ²⁺ mEq	K ⁺ mEq	

溶解後: 遮光、2-8°Cで4hr以内に投与開始

1ユニット: DNR 0.44mg+AraC 1mg

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 5-8週日) 《 》 クール

投与順	Rp	Total時間入力	投与スケジュール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロンバッグ 50mL 手技: 静脈内 経路: ★フィルター不可	30分 DIV		●		●																									
2	ビキセオス ()ユニット +生食 500mL +注射用水 40mL 手技: 静脈内 経路: 1VをDW19mLで溶解(5U/mL)	90分 DIV		●		●																									
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	500mL/hr DIV		●		●																									
4	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●		●																									
5	手技: 経路:																														

ビキセオス

1VをDW 19mLで溶解→100ユニット/20mL→5U/mL

最大2サイクルまで

※ 最後の寛解導入療法開始から5-8週間後に、1サイクル目としてd1、3に点滴静注

※ 1サイクル目の投与開始後に病態が進行していない患者で、本剤の忍容性が良好な場合に、2コース目としてd1、3に点滴静注する