

化学療法レジメンセット登録用紙

1/1頁

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	119	CODE	004012001119
診療科	血液内科	医師	伊東
セット名称	Epiricotamab ⑩サイクル以降		
申請年月日	令和 6 年 12月10日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エプキンリ	s.c	48 mg/body

リザーバー	末梢	皮下	確認		
		●	医師	看護師	薬剤師
投与時間		総液量 mL			
時間	分	Mg ²⁺ mEq	K ⁺ mEq		

②・③サイクル目:d1・8・15・22

④-⑨サイクル目:d1・15 ⑩サイクル以降:d1

②・③サイクル目:d1・8・15・22		投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 28 日)《 》 クール																													
④-⑨サイクル目:d1・15		⑩サイクル以降:d1		Total時間入力	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	エプキンリ 48mg 手技:皮下注 経路:0.8mLでシリンジ払い出し	s.c		●																											
2	手技: 経路:																														
3	手技: 経路:																														

前回投与後にGrade2/3のCRSが現れた場合は、前投薬(DEX16mg) 4日間内服が必要

CRS及びTLSを予防するための水分補給 【参考】国内第Ⅰ/Ⅱ相試験(GCT3013-04試験)で以下の対応が追加で規定

1サイクルでは、患者は以下の全ての要件を遵守することが強く推奨された

- ・本剤投与前24時間に2-3Lの水分を摂取する
- ・本剤投与前24時間に降圧薬の服用を中断する
- ・本剤投与日は、投与前に等張輸液500mLの投与を受ける。かつ本剤投与後24時間に2-3Lの水分を摂取

CRSの対応・・・Grade1でも下記投与の考慮

【抗サイトカイン療法】 アクテムラ 8mg/kgを1時間かけて点滴(1回800mgを超えない)。8時間以上あけて24時間以内に最大2回投与可能

【ステロイド療法】 DEX10-20mg/日投与を考慮する

投与部位

- ・特に、1-3サイクル目では、大腿部、腹部等に左右交互に投与するなど同一注射部位を避ける