化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No（3桁）	120	CODE	004012001120
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	Pola+CHP（THP）		
申請年月日	令和6年2月3日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ポライビー	DIV	1.8 mg/kg
ピノルビン	DIV	30 mg/㎡
エンドキサン	DIV	500 mg/㎡
プレドニン	p.o	30 mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

投与時間	総液量 mL	
4 時間 30 分	Mg^{2+} mEq	K^{+} mEq

※ 30mg/V：DW 1.8mLで溶解、140mg/V：DW 7.2mLで溶解（20mg/mL）

※ ポライビー：希釈後最終濃度：0.72mg/mL～2.70mg/mL

投与スケジュール：（ 投 休 ） or （投与間隔 21 日）《 》クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Total時間入力	□	☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1	プレドニン錠 （ ）錠 手技：内服 経路：	p.o		●	●	●	●	●																	（●）	（●）	（●）	（●）	（●）		
2	グラニセトロンバッグ 50mL 手技：静脈内 経路：前投服用/フィルター使用	30分 DIV		●																					（●）						
3	ポライビー （ ）mg +生食 50mL +注射用水 20mL 手技：静脈内 経路：DW溶解（20mg/mL）/前投服用30分後	90-30分 DIV		●	90分、2回目以降は30分可																				（●）						
4	ピノルビン （ ）mg +5%ブドウ糖 100mL 手技：静脈内 経路：	30分 DIV		●																					（●）						
5	エンドキサン （ ）mg +生食 250mL 手技：静脈内 経路：溶解後6時間以内に投与終了する事	2時間 DIV		●																					（●）						
6	ソルデム3A 1000mL 手技：静脈内 経路：	6時間 DIV		●																					（●）						
7	生食 50mL 手技：静脈内 経路：	500mL/hr DIV		●																					（●）						
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技：静脈内 経路：	IV		●																					（●）						
9	手技： 経路：																														
10	手技： 経路：																														