化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	血球貪食性リンパ組織球症		
No（3桁）	003	CODE	004014001003
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	☆HLH-2004 Initial Therapy		
申請年月日	令和7年5月26日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エトポシド	DIV	150 mg/㎡
デキサート(Day1～14)	DIV	8.25 mg/㎡
デキサート(Day15～28)	DIV	4.125 mg/㎡
デキサート(Day29～42)	DIV	2.0625 mg/㎡
デキサート(Day43～56)	DIV	1.03125 mg/㎡

Aポート	Vポート	末梢	確認		
			医師	看護師	薬剤師
	●				

※シクロスポリン：6mg/kg/日で開始を推奨

投与スケジュール：（ 投 休 ）or （Interval日数 日）《 1 》クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロンバック 50mL 手技：静脈内 経路：	30分 DIV		●			●				●			●				●							●						
2	生食100mL+デキサート（#1） （ ）mg 手技：静脈内 経路：	1時間 DIV		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
3	生食100mL+デキサート（#2） （ ）mg 手技：静脈内 経路：	1時間 DIV																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	5%ブドウ糖500mL+エトポシド（ ）mg 手技：静脈内 経路：	2時間 DIV		●			●				●			●				●							●						
5	ソルデム3A 1000mL 手技：静脈内 経路：	6時間 DIV		●			●				●			●				●							●						
6	ヘパリンロック 1筒 手技： 経路：	IV		●			●				●			●				●							●						
7	シクロスポリン（ ）mg トラフ値200μg/L目標 手技： 経路：	p.o		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	髄腔内投与（メソトレキセート12mg+プレドニン10mg） 手技： 経路：	IT																●							●						
9	手技： 経路：																														
10	手技： 経路：																														

レジメ検討委員会

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	血球貪食性リンパ組織球症		
No（3桁）	003	CODE	004014001003
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	☆HLH-2004 Initial Therapy		
申請年月日	令和7年5月26日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エトポシド	DIV	150 mg/㎡
デキサート(Day1～14)	DIV	8.25 mg/㎡
デキサート(Day15～28)	DIV	4.125 mg/㎡
デキサート(Day29～42)	DIV	2.0625 mg/㎡
デキサート(Day43～56)	DIV	1.03125 mg/㎡

Aポート	Vポート	末梢	確認		
			医師	看護師	薬剤師
	●				

投与スケジュール：（　　投　　休）or（Interval日数　　日）《　　》クール

投与順	Rp	投与時間	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
11	グラニセトロンバック 50mL 手技：静脈内　経路：	30分 DIV	●							●							●							●						
12	生食100mL+デキサート（#3）（　　）mg 手技：静脈内　経路：	1時間 DIV	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
13	生食100mL+デキサート（#4）（　　）mg 手技：静脈内　経路：	1時間 DIV															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	5%ブドウ糖250mL+エトポシド（　　）mg 手技：静脈内　経路：	2時間 DIV	●							●							●							●						
15	ソルデム3A 1000mL 手技：静脈内　経路：	6時間 DIV	●							●							●							●						
17	ヘパリンロック 1筒 手技：　経路：	IV	●							●							●							●						
16	シクロスポリン（　）mg　トラフ値200μg/L目標 手技：　経路：	p.o	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	髄腔内投与（メソトレキセート12mg+プレドニン10mg） 手技：　経路：	IT	●							●																				
19	手技：　経路：																													
20	手技：　経路：																													

レジメ検討委員会