

化学療法レジメンセット登録用紙

1/1頁

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【MM】多発性骨髄腫		
No(3桁)	082	CODE	004015001082
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	IsaKd(1コース目)		
申請年月日	令和 5 年 9月19日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
サークリサ	DIV	10 mg/kg
カイプロリス(d1.2)	DIV	20 mg/m ²
カイプロリス	DIV	56 mg/m ²
デキサート	DIV	20 mg/body

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師
総輸液量 : L 投与時間 : 時間 分					

※ サークリサ投与15～60分前に前投薬服用

※ DEX(20mg):d1.2.8.9.15.16.21.22

※ サークリサ投与15～60分前に前投薬服用			投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 28 日)《 1 》クール																												
※ DEX(20mg):d1.2.8.9.15.16.21.22			Total時間入力	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 50mL +デキサート 16.5mg 手技:静脈内 経路:フィルター使用/前投薬	30分 DIV		●							●							●							●						
2	デカドロン 20mg 手技:内服 経路:	p.o			●							●							●							●					
3	サークリサ ()mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:Total:250mLにする	下記参照 DIV		●							●							●							●						
4	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV		●							●							●							●						
5	5%ブドウ糖 100mL 手技:静脈内 経路:	15分 DIV		●	●						●	●						●	●												
6	カイプロリス (20mg/㎡)mg +注射用水 20mL +5%ブドウ糖 50mL 手技:静脈内 経路:Dwで溶解(2mg/mL)	30分 DIV		●	●																										
7	カイプロリス (56mg/㎡)mg +注射用水 60mL +5%ブドウ糖 50mL 手技:静脈内 経路:Dwで溶解(2mg/mL)	30分 DIV									●	●						●	●												
8	5%ブドウ糖 100mL 手技:静脈内 経路:	15分 DIV		●	●						●	●						●	●												
9	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV		●	●						●	●						●	●						●						
10	手技:静脈内 経路:																														