

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【MM】多発性骨髄腫		
No(3桁)	083	CODE	004015001083
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	IsaKd(2コース以降)		
申請年月日	令和 5 年 9月19日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
サークリサ	DIV	10 mg/kg
カイトロリス	DIV	56 mg/m ²
デキサート	DIV	20 mg/body

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師

総輸液量 : L
 投与時間 : 時間 分

※ サークリサ投与15~60分前に前投薬服用

※ DEX(20mg) : d1.2.8.9.15.16.22.23

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 28 日)《 1 》クール

投与順	Rp	Total時間入力	投与スケジュール																												
			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 50mL +デキサート 16.5mg 手技: 静脈内 経路: フィルター使用/前投薬	30分 DIV		●															●												
2	デカドロン 20mg 手技: 内服 経路:	p.o			●						●	●								●						●	●				
3	サークリサ ()mg +生食 250mL 手技: 静脈内 経路: Total: 250mLにする	下記参照 DIV		●															●												
4	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		●															●												
5	5%ブドウ糖 100mL 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV		●	●						●	●							●	●											
6	カイトロリス ()mg +注射用水 60mL +5%ブドウ糖 50mL 手技: 静脈内 経路: Dwで溶解(2mg/mL)	30分 DIV		●	●						●	●							●	●											
7	5%ブドウ糖 100mL 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV		●	●						●	●							●	●											
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●	●						●	●							●	●											
9	手技: 静脈内 経路:																														
10	手技: 静脈内 経路:																														