

化学療法レジメンセット登録用紙

1/2頁

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【MM】多発性骨髄腫		
No(3桁)	084	CODE	004015001084
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	IsaVRd(1サイクル目)		
申請年月日	令和 7 年 5月20日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
サークリサ	DIV	10 mg/kg
ボルテゾミブ	s.c	1.3 mg/m ²
デキサート	DIV	20 mg/body
レナリドミド	PO	25 mg/body

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師
総輸液量 : 0.35 L			投与時間 : 2 時間 40 分		

※ サークリサ投与15～60分前に前投薬服用

※ DEX(20mg):d1.2.4.5.8.9.11.12.15.22.23.25.26.29.30.32.33

※ サークリサ投与15～60分前に前投薬服用			投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 42 日)《 1 》クール																												
※ DEX(20mg):d1.2.4.5.8.9.11.12.15.22.23.25.26.29.30.32.33			Total時間入力	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 50mL +デキサート 16.5mg 手技:静脈内 経路:フィルター使用/前投薬	30分 DIV		●							●							●							●						
2	デカドロン 20mg 手技:内服 経路:	p.o			●		●	●				●		●	●											●		●	●		
3	サークリサ ()mg +生食 250mL 手技:静脈内 経路:Total:250mLにする	別紙参照 DIV		●							●							●							●						
4	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV		●							●							●							●						
5	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV		●							●							●							●						
6	ボルテゾミブ()mg + 生食()mL 手技:皮下 経路:	sc		●			●				●			●											●			●			
7	レナリドミド 25mg 手技: 経路:	PO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●	●	●	●	●	●	●
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														

化学療法レジメンセット登録用紙

2/2頁

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【MM】多発性骨髄腫		
No(3桁)	084	CODE	004015001084
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	IsaVRd(1サイクル目)		
申請年月日	令和 7 年 5月20日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
サークリサ	DIV	10 mg/kg
ボルテゾミブ	s.c	1.3 mg/m ²
デキサート	DIV	20 mg/body
レナリドミド	PO	25 mg/body

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師

総輸液量 : 0.35 L
投与時間 : 2 時間 40 分

※ DEX(20mg) : d1.2.4.5.8.9.11.12.15.22.23.25.26.29.30.32.33

投与順	Rp	Total時間入力	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
1	生食 50mL +デキサート 16.5mg 手技: 静脈内 経路: フィルター使用/前投薬	30分 DIV	●																											
2	デカドロン 20mg 手技: 内服 経路:	p.o		●		●	●																							
3	サークリサ ()mg +生食 250mL 手技: 静脈内 経路: Total: 250mLにする	別紙参照 DIV	●																											
4	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV	●																											
5	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV	●																											
6	ボルテゾミブ()mg + 生食()mL 手技: 皮下 経路:	sc	●			●																								
7	レナリドミド 25mg 手技: 経路:	PO	●	●	●	●	●	●	●																					
8	手技: 経路:																													
9	手技: 経路:																													
10	手技: 経路:																													