

化学療法レジメンセット登録用紙

1/2頁

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【MM】多発性骨髄腫		
No(3桁)	085	CODE	004015001085
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	IsaVRd(2-4サイクル目)		
申請年月日	令和 7 年	5月20日	
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
サークリサ	DIV	10 mg/kg
ボルテゾミブ	s.c.	1.3 mg/m ²
デキサート	DIV	20 mg/body
レナリドミド	PO	25 mg/body

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師

総輸液量 : 0.35 L
投与時間 : 2 時間 40 分

※ サークリサ投与15～60分前に前投薬服用

※ DEX(20mg) : d1.2.4.5.8.9.11.12.15.22.23.25.26.29.30.32.33

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 42 日)《 3 》クール

※ DEX(20mg) : d1.2.4.5.8.9.11.12.15.22.23.25.26.29.30.32.33			Total時間入力	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 50mL +デキサート 16.5mg 手技: 静脈内 経路: フィルター使用/前投薬	30分 DIV		●														●													
2	デカドロン 20mg 手技: 内服 経路:	p.o			●		●	●			●	●		●	●										●	●		●	●		
3	サークリサ ()mg +生食 250mL 手技: 静脈内 経路: Total: 250mLにする	別紙参照 DIV		●														●													
4	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		●														●													
5	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●														●													
6	ボルテゾミブ()mg + 生食()mL 手技: 皮下 経路:	sc		●			●				●			●											●			●			
7	レナリドミド 25mg 手技: 経路:	PO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●	●	●	●	●	●	●
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														

抗癌剤名称	手技	標準投与量
サークリサ	DIV	10 mg/kg
ボルテゾミブ	s.c.	1.3 mg/m ²
デキサート	DIV	20 mg/body
レナリドミド	PO	25 mg/body

総輸液量	:	0.35	L
投与時間	:	2	時間 40 分

レジメ検討委員会