

化学療法レジメンセット登録用紙

1/1頁

領域	血液腫瘍	ルート	皮下
適応	【MM】多発性骨髄腫		
No(3桁)	040	CODE	004015004040
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	Elranatamab(1-2週目)		
申請年月日	令和7年6月2日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エルレフィオ(day1)	SC	12 mg/body
エルレフィオ(day4)	SC	32 mg/body
エルレフィオ(day8)	SC	76 mg/body

皮下	Vポート	末梢	確認		
●			医師	看護師	薬剤師

※投与1時間前に前投薬/デカドロン20mg服用

※調製後、室温で4時間以内に使用すること

			投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 14 日)《 1 》クール																												
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	エルレフィオ 12mg 手技:皮下 経路:1Vから0.3mL抜き取る	皮下		●																											
2	エルレフィオ 32mg 手技:皮下 経路:1Vから0.8mL抜き取る	皮下					●																								
3	エルレフィオ 76mg 手技:皮下 経路:1Vから0.8mL抜き取る	皮下									●																				
4	手技: 経路:																														
5	手技: 経路:																														
6	手技: 経路:																														
7	手技: 経路:																														
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														